

Что нужно знать о лекарственном препарате Риваксаб®?

- Лекарственный препарат Риваксаб® разжижает кровь, препятствуя тем самым образованию опасных для здоровья кровяных сгустков — тромбов.
- Риваксаб® следует принимать в строгом соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Для достижения оптимальной защиты вашего организма от образования тромбов не следует пропускать прием очередной дозы препарата.
- Запрещается прекращать прием препарата Риваксаб® самостоятельно без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку в этом случае риск образования тромбов может увеличиться.

- Прежде чем начать применение лекарственного препарата Риваксаб®, сообщите вашему лечащему врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.

- Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете лекарственный препарат Риваксаб®.

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

При применении препарата для разжижения крови, в том числе

препарата Риваксаб®, важно обращать внимание на возможные побочные эффекты.

Наиболее частым побочным эффектом является кровотечение. Не начинайте прием препарата Риваксаб® без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:

- необъяснимая отечность
- припухлость тканей или суставов, боль в суставах (могут быть следствием кровоизлияния)
- головная боль, головокружение или слабость
- появление синяков в необычных местах, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза

- более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение
- кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;
- кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи.

Как принимать лекарственный препарат Риваксаб®?

- Для достижения оптимальной защиты лекарственный препарат Риваксаб®
 - в дозировке 2,5 мг можно принимать независимо от приема пищи;
 - в дозировке 10 мг можно принимать независимо от приема пищи;
 - в дозировке 15 мг следует принимать с пищей;
 - в дозировке 20 мг следует принимать с пищей.

Риваксаб® ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Риваксаб® 2,5 мг

Риваксаб® 10 мг

Риваксаб® 15 мг

Риваксаб® 20 мг

- Всегда носите эту памятку с собой.
- При каждом обращении за медицинской помощью, в том числе стоматологической, показывайте эту памятку врачу до начала лечения.

Я получаю антикоагулянтную терапию
лекарственным препаратом
Риваксаб® (ривароксабан).

Ф.И.О.:

Прием других лекарственных
препаратов / наличие

Адрес:

Дата рождения:

Масса тела:

В экстренных случаях
уведомить:

Ф. И. О. врача:

Номер телефона врача:

Печать врача:

Уведомить также:

Ф.И.О.:

Номер телефона:

Кем приходится пациенту:

Информация для
медицинских
работников:

- Не следует учитывать показатели МНО, поскольку они не отражают степень антикоагулянтной активности лекарственного препарата Риваксаб®.

Локальная версия 2.0
Дата утверждения национальным
уполномоченным органом: ДД.ММ.ГГГГ.

