

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Я получаю антикоагулянтную терапию лекарственным препаратом Рикунатрон (ривароксабан)

РИКУНАТРОН 2,5 мг

РИКУНАТРОН 10 мг

РИКУНАТРОН 15 мг

РИКУНАТРОН 20 мг

Всегда носите с собой эту памятку. Показывайте эту памятку при каждом обращении за медицинской помощью, в том числе стоматологической.

Дата рождения: _____

Масса тела: _____

Прием других препаратов (перечислить):

Сопутствующие заболевания:

Контактное лицо на случай развития неотложного состояния (ФИО, кем приходится):

Номер телефона:

Информация для медицинских работников:

Не следует учитывать показатели МНО, так как они не отражают степень активности препарата Рикунатрон!

Что нужно знать о лекарственном препарате Рикунатрон?

- Лекарственный препарат Рикунатрон разжижает кровь, препятствуя образованию опасных тромбов.
- Рикунатрон следует принимать в строгом соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Для достижения оптимальной защиты от образования тромбов никогда не пропускайте прием очередной дозы препарата.
- Запрещается прекращать прием препарата Рикунатрон без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку может увеличиться риск образования тромбов.
- Перед началом применения Рикунатрона сообщите врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.
- Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете лекарственный препарат Рикунатрон.

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

При применении препарата для разжижения крови, в том числе препарата Рикунатрон, важно обращать внимание на возможные нежелательные реакции.

Наиболее частой нежелательной реакцией является кровотечение. Не начинайте прием препарата Рикунатрон без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:

- появление необычных синяков, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза;
- более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение;
- кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;
- кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи.
- боль;
- отечность или дискомфорт в мышцах и суставах;
- головная боль, головокружение или слабость.

Как принимать лекарственный препарат Рикунатрон?

для достижения оптимальной защиты Рикунатрон:

- в дозировке 2,5 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 10 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 15 мг следует принимать во время приема пищи;
- в дозировке 20 мг следует принимать во время приема пищи.